



# Ecologie

In het MER zijn de effecten van Windplanblauw voor vogels, vleermuizen en andere diersoorten onderzocht. Wet- en regelgeving bepaalt of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om significante gevolgen voor vogels, vleermuizen en andere diersoorten te voorkomen. Een samenvatting hiervan ziet u in de tabel hiernaast.

<b>Soorten waarvoor geen maatregelen nodig zijn</b>	<b>Soorten waarvoor na mitigatie geen significante gevolgen zijn</b>
<b>Broedvogels</b> Waaronder: aalscholver, bruine kiekendief, oeverzwaluw	<b>Vleermuizen</b> Waaronder: ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis. Mitigerende maatregel: stilstandsvoorziening turbines Swifterbos
<b>Niet-broedvogels</b> Waaronder: tafeleend, krakeend, kolgans, grauwe gans, aalscholver en meerkoet	<b>Fuut</b> Mitigerende maatregel: rustgebied langs IJsselmeerdijk
<b>Lokale vogelsoorten</b> Waaronder: knobbelzwaan, kuifeend, wilde eend, aalscholver en kievit	
<b>Overige soorten</b> Waaronder: verschillende soorten amfibieën, reptielen, vissen, ongewervelden en grondgebonden zoogdieren	